

【施用実績】果樹

■ブドウ(圃場:長野県)



苦土欠乏症(トラ葉)

対 照 区



マインマグ施用区

品種：ナガノパープル
 (6~7年生、短樺剪定、H字仕立て)
 対照区：NPK慣行施肥
 マインマグ施肥区：
 NPK慣行施肥+マインマグC48kg/10a
 4月上旬、表面施用

【評価】

対照区では、苦土欠乏症が発生。
 これに対しマインマグ施用区は、**苦土欠乏症の発生が少なかった。**

■ブドウ(圃場:北海道)



対 照 区



マインマグ施用区



晩腐病



品種：ケルナー (8年生)

対照区：
 NPK慣行施肥+他社総合微量元素肥料45kg/10a

マインマグ施肥区：
 NPK慣行施肥+マインマグW45kg/10a
 5月上旬、表面施用

【評価】

対照区では、晩腐病が発生。
 これに対し、マインマグ施用区は、**晩腐病の発生が著しく少なかった。**

■ブドウ(圃場:長野県)

品種：シャルドネ、カベルネソーヴィニオン

対照区：NPK慣行施肥

マインマグ施肥区：NPK慣行施肥+マインマグN及びC、4月上旬、表面施用



対 照 区



マインマグN区(75kg/10a)



対 照 区



マインマグC区(100kg/10a)

【評価】

・マインマグ施用区は**病気(晩腐病・べと病)の発生や害虫の被害が少なかった。**

・マインマグの施用により、**ケイ酸、苦土の吸収量が増大した。**

